


|                                                                                   |                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|  | <b>ESPECIFICAÇÃO DE P.A</b> | Código. EPA 08   |
|                                                                                   |                             | Data: 15/09/2021 |
| TÍTULO: PROTECT EVOLUTION                                                         |                             |                  |

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1 – pH</b>                       | 6,20                                                              |
| <b>2 – DENSIDADE (g/cmt)</b>        | 1,20                                                              |
| <b>3 – NATUREZA FÍSICA</b>          | Solução Homogênea                                                 |
| <b>4 – ASPECTO</b>                  | Verde                                                             |
| <b>5 – ESPECIFICAÇÕES</b>           | N:11%; B:0,05% ; Mo:0,1%                                          |
| <b>6 – REGISTRO</b>                 | 81360 10170-1                                                     |
| <b>7 – FONTE ( MATÉRIA- PRIMA )</b> | Solução Nitrogenada<br>Ácido Bórico 17%<br>Molibdato de Sódio 39% |

|  |                             |                  |
|--|-----------------------------|------------------|
|  | <b>ESPECIFICAÇÃO DE P.A</b> | Código. EPA 08   |
|  |                             | Data: 15/09/2021 |

Fertilizante especial que pode ser posicionado para todas as culturas em todas fases fenológicas, quando aplicado nas plantas o produto contribui e auxilia as culturas a alcançarem seu máximo potencial produtividade, favorecendo o manejo e aumento da rentabilidade ao produtor.

Minimização e alívio de estresses, ativação do sistema de defesa (indução de resistência) e estímulo na atividade metabólica das plantas. Como resultado, plantas com melhor desenvolvimento, vigor e sanidade.

Excelente ferramenta a ser utilizada no manejo de nematoides nas culturas, promovendo melhor enraizamento e condição de tolerância aos ataques e danos causados por esses parasitas, criando uma “blindagem” e dificultando sua penetração nas raízes e, conseqüentemente, sua multiplicação. (Ação contra nematoides).

É um ótimo indutor de resistência no mercado com ação de translocação nas plantas, aplicado via folha que consegue atingir até o sistema radicular, podendo ser aplicado em todas as culturas de interesse econômico, como algodão, soja, café, citros, cana-de-açúcar, feijão, milho, tomate, frutíferas em geral, etc.

#### TABELA DE RECOMENDAÇÃO

| CULTURA        | FORMA DE APLICAÇÃO | DOSAGEM         | ÉPOCA DE APLICAÇÃO        |
|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| ALGODÃO        | Foliar             | 50 a 100 ml/ha  | Vegetativo                |
|                |                    | 50 a 100 mL/ha  | Reprodutivo               |
| AMENDOIM       | Foliar             | 100 mL/ha       | Vegetativo                |
|                |                    | 50 mL/ha        | Florescimento             |
|                |                    | 50 mL/ha        | Reprodutivo               |
| CAFÉ           | Foliar             | 150 mL/ha       | Pós colheita              |
|                |                    | 150 mL/ha       | Florada                   |
|                |                    | 150 mL/ha       | Frutificação              |
| CANA-DE-AÇÚCAR | Solo               | 200 a 300 mL/ha | Plantio (cobridor)        |
|                |                    | 200 a 300 mL/ha | Corte soqueira            |
|                | Foliar             | 200 mL/ha       | Perfilhamento             |
| CITRUS         | Foliar             | 150 mL/ha       | Pré florada               |
|                |                    | 150 mL/ha       | Plena florada             |
|                |                    | 150 mL/ha       | Pós florada               |
| FEIJÃO         | Foliar             | 100 mL/ha       | Entre os estádios V3 e V4 |
|                |                    | 50 mL/ha        | Entre os estádios R5 e R6 |
|                |                    | 50 mL/ha        | Entre os estádios R7 e R8 |

|               |        |           |                           |
|---------------|--------|-----------|---------------------------|
| <b>MILHO</b>  | Foliar | 50 mL/ha  | Estádio V8                |
|               |        | 50 mL/ha  | Estádio VT (Pendoamento)  |
| <b>SOJA</b>   | Foliar | 100 mL/ha | Entre os estádios V3 e V6 |
|               |        | 50 mL/ha  | Estádio R1                |
|               |        | 50 mL/ha  | Entre os estádios R4 e R5 |
| <b>TOMATE</b> | Foliar | 100 mL/ha | Transplântio              |
|               |        | 100 mL/ha | Vegetativo                |
|               |        | 100 mL/ha | Florada                   |
|               |        | 100 mL/ha | Frutificação              |