

K-Spot

Spot on
Uso Tópico
Uso Veterinário

Ectoparasitíctica: Controle de pulgas, carrapatos e piolhos em cães.

Fórmula:

Cada 1 mL contém:

Permetrina	0,45 g
Metopreno	12,5 mg
Veículo q.s.p.	1,0 mL

K-Spot é uma associação de dois princípios ativos, a Permetrina e o Metopreno, eficazes no combate a ectoparasitoses de cães, causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis* e *C. canis*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e piolhos. A ação sinérgica dos princípios ativos confere ao **K-Spot** eficácia adulta, larvívica e ovívica. Deste modo o **K-Spot**, além de atuar imediatamente no controle dos parasitas tem ação prolongada inibindo reinfestações por até 2 meses.

Indicações:

K-Spot é principalmente indicado no tratamento de ectoparasitoses em cães, causadas por pulgas, carrapatos e piolhos. Também é indicado no auxílio ao tratamento e controle da Dermatite Alérgica a Picadas de Pulgas (DAPP), e no controle das infestações por cestódeos que acometem os cães.

Via de Administração e Modo de Usar:

Aplicação externa em cães. Aplicar todo o conteúdo da bisnaga na região da nuca e entre as escápulas (cernelha) ao longo do dorso lombar na pele do animal, afastando o pelo do mesmo, evitando que o produto escorra. Caso haja necessidade, repetir a aplicação a cada 2 a 3 semanas.

Posologia:

PESO DO CÃO	DOSE
Até 7,5 Kg	1 bisnaga de 2 mL
De 7,5 a 15 Kg	1 bisnaga de 4 mL
De 15 a 22,5 Kg	1 bisnaga de 6 mL
De 22,5 a 30 Kg	1 bisnaga de 8 mL
Acima de 30 Kg	2 bisnagas de 8 mL

K-Spot pode ser utilizado em fêmeas gestantes, em lactação, animais idosos e filhotes acima de 6 semanas.

Aplicação:




■ Abrir a bisnaga, removendo a tampa cuidadosamente.



■ Ao administrar o produto, afastar bem os pelos e colocar a ponta da bisnaga sobre a pele do animal.



■ Aplicar todo o conteúdo da bisnaga na pele do animal, afastando o pelo, na região da nuca e entre as escápulas ao longo do dorso lombar, evitando que o produto escorra.



■ Certifique-se de que o cão a ser tratado está na faixa de peso adequada para esta apresentação.

Cuidados Complementares:

- Para evitar reinfestação, o local onde vivem os cães deve ser tratado, usando produtos adequados para esta finalidade;
- Tratar os animais que tiveram contato com o animal doente;
- Deve ser respeitado um intervalo entre a aplicação e o banho de no mínimo 5 dias.

Precauções de Uso:

- Em caso de contato com olhos e boca, lavar abundantemente com água;
- Não repetir o tratamento com menos de 7 dias;
- Não reutilizar a embalagem;
- Manter o produto em sua embalagem original;
- Não guardar ou aplicar junto com alimentos, bebidas, medicamentos e produtos de higiene;
- Conservar em local fresco, seco e ao abrigo da luz;
- Manter fora do alcance de crianças e dos animais domésticos;
- Utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras.

Contraindicações:

Não use em gatos.



Apresentação: Bisnaga contendo 2, 4, 6 e 8 mL.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

PROIBIDO PARA USO HUMANO.



CUIDADO VENENO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 9.088 em 15/05/2005.

Responsável Técnico: Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP n° 11.427.

Proprietário:

Syntec do Brasil Ltda,
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim
Santana de Parnaíba - CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fabricante:

Vansil Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Rua João Augusto Cirelli, 640 - Descalvado/SP
CEP: 13690-000
CNPJ: 50.472.547/0001-68
INDÚSTRIA BRASILEIRA